

藥品使用指導單

杜使平[®]膠囊 (Doxepine[®] 25 mg)

■ 藥品成分名

Doxepin

■ 藥品外觀

藍色、膠囊；大小：1.5 公分；標記：[SC D-10]

■ 作用

杜使平[®]膠囊可用於調節情緒、止癢。

■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋指示服用或按照醫（藥）師的指示服用。

■ 注意事項

- 服用此藥尿液有可能會呈藍綠色，請勿驚慌。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病、青光眼，應告知您的醫（藥）師。
- 若您同時有在服用其他抗憂鬱、抗心律不整藥品，請事先告知您的醫師。
- 服用藥物期間請避免飲酒。
- 服用此藥初期、劑量有改變時，容易有困倦、眩暈、視力模糊、運動失調、震顫等副作用，請避免操作機械及開車，並小心行動以避免發生跌倒意外，尤其是老年人請特別注意。
- 若長期服用本藥品不建議突然停藥，需慢慢降低劑量至完全停藥以預防戒斷症狀發生。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：口乾、視力模糊、倦睡。
- 若有以下情況，請立即就醫：癲癇、不尋常出血、呼吸困難、尿液滯留、心跳快速、視力改變等。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0097

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

