

# 藥品使用指導單

## 紓癌特<sup>®</sup>膠囊 (Sutent<sup>®</sup> 12.5 mg)

### ■ 藥品成分名

Sunitinib

### ■ 藥品外觀

深紅色，長圓柱形，膠囊；標記：[Pfizer][12.5mg]

### ■ 作用

紓癌特<sup>®</sup>膠囊為一種抗腫瘤藥物，用於治療癌症。

### ■ 用法

- 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
- 紓癌特<sup>®</sup>膠囊可隨餐服用，亦可空腹服用；若出現胃部不適可與食物併服。
- 膠囊不可打開也不可嚼碎。

### ■ 注意事項

- 若您有肝臟或心臟疾病，應告知您的醫（藥）師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 盡量避免飲用大量葡萄柚汁，以免影響藥品的代謝及療效。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑、人蔘、銀杏等等，請事先告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 使用本藥後可能會造成噁心或嘔吐，以少量多餐的方式進食並且多漱口以加強口腔衛生。
- 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須小心受傷，建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。
- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況並越趨嚴重時，請回診告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛、口乾、手腳麻、水腫、視力模糊、舌頭麻、味覺改變等。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請帶回醫院或藥局回收，不應隨便丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0098

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

