

# 藥品使用指導單

## 得舒緩<sup>®</sup>錠 (Tarceva<sup>®</sup> 150 mg)

### ■ 藥品成分名

Erlotinib

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；標記：[TARCEVA 150]

### ■ 作用

得舒緩<sup>®</sup>錠會干擾您體內癌細胞的生長，可用於治療癌症，例如肺癌。

### ■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 必須空腹服用，建議飯前一小時或飯後兩小時服用。

### ■ 注意事項

- 有肝、腎疾病及抽菸者，應告知您的醫（藥）師。
- 若您有服用Aspirin、銀杏、人參等，請先告知您的醫師或藥師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 請勿和葡萄柚汁併服。
- 若您要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、角膜炎、胸悶、糞便或尿液顏色變深、頭暈、倦怠、咳嗽、噁心嘔吐、食慾不振、腹痛、腹瀉、便秘、體重減輕。
- 有以下情形請立即就醫：皮疹惡化、嚴重或持續性的腹瀉、噁心、厭食或嘔吐、出現不明原因的呼吸短促或咳嗽症狀、眼睛不適。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請帶至醫療院所丟棄，勿隨意丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0099

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

