

# 藥品使用指導單

## 賽得<sup>®</sup>膠囊 (Thado<sup>®</sup> 50 mg)

### ■ 藥品成分名

Thalidomide

### ■ 藥品外觀

黃橙/白雙色，長圓柱形，膠囊；標記：[THADO][THADO]

### ■ 作用

- 治療癩瘋性結節性紅斑（俗稱癩瘋病）。
- 治療多發性骨髓瘤的搭配療法。
- 作用在於調節免疫功能及抑制血管生長。

### ■ 用法

- 按您的醫師指示服用，最好於睡前或晚餐飯後一小時服用。
- 藥品保存在原鋁箔包裝中，服用前才取出。

### ■ 注意事項

- 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- 在服用本藥品前，請務必確認您已詳讀使用同意書並簽章。
- 若您正懷孕中或準備懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，因本藥可能會傷害胎兒而導致畸型；必要時需做好避孕措施，以避免懷孕。
- 若您具有血栓栓塞事件病史，或是同時在使用紅血球生成製劑或服用荷爾蒙類藥品，請告知您的醫師。
- 因此藥易導致嗜睡，開車或操控其他複雜危險性的機械應注意。
- 服用此藥可能引起暈眩及姿勢性低血壓，因此，若要從躺臥姿勢起身站立時，建議先坐幾分鐘後再站起來。
- 服用此藥期間避免喝酒、捐血。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況且越趨嚴重，請告知您的醫師：疑似或發現懷孕、發燒、姿勢性低血壓、心跳加快、紅斑性的皮膚疹、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛、口乾、水腫、視力模糊等。
- 當出現手及足部麻木感、刺痛、疼痛或是燒灼感，請立即告知您的醫師。
- 若出現血栓性栓塞症的徵候，如發生呼吸短促、胸痛、手臂或小腿腫等症狀，請立即就醫。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0101

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

