

藥品使用指導單

滅喘淨微錠(Meptin® 25 mcg)

■ 藥品成分名

Procaterol

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.50公分；標記：[O，G][22]

■ 作用

支氣管擴張

■ 用法

通常成人一日1~2次，每次服用2錠，劑量得依年齡、症狀適宜增減。

■ 注意事項

- 服藥期間請避免喝大量的咖啡與茶。
- 甲狀腺亢進、心臟疾病、糖尿病患者請於服藥期間密切留意身體變化。
- 滅喘淨微錠並非吸入型類固醇或其他抗發炎藥之替代品，就算使用本劑後症狀改善，仍不應減量或停用吸入型類固醇，除非經醫師指示許可。
- 若您有在同時服用theophylline類藥物、類固醇或利尿劑時，請事先告知醫師。
- 本藥品使用於孕婦或可能懷孕的婦女前，需經醫師謹慎評估。若為哺乳中之婦女因病情需要而服用本品，請停止哺乳。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
噁心、嘔吐、心悸、心跳過速、頭痛、發疹、顫抖。
- 其他不常見的副作用：
面部潮紅、失眠、無力感、四肢麻木、肌肉痙攣。
- 如果開始服用減喘淨微錠後，出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0102

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

