

藥品使用指導單

妥泰® 膜衣錠/分散型膠囊 (Topamax® 100/25 mg)

■ 藥品成分名

Topiramate

■ 藥品外觀

Topamax 100mg：明黃橙，圓扁形，錠劑，大小：0.91 公分，標記：[TOP][100]

Topamax sprinkle 25mg：透明/白色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[TOP，25mg]

■ 作用

- 治療成人及2歲以上兒童局部癲癇。
- 預防偏頭痛。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 可飯前或飯後服用。
- 有錠劑及分散型膠囊（Topamax sprinkle 25 mg），兩種劑型，不建議將錠劑剝開，若為不能吞服錠劑的患者，如兒童與老年人，可將分散型膠囊剝開服用，不需咀嚼。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或曾對此藥成分過敏，或者是有肝、腎疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 不建議在治療期間哺乳或懷孕。
- 若有服用荷爾蒙類藥品或其他抗癲癇藥品，請告知您的醫生及藥師。
- 服用此藥期間避免喝酒。
- 服藥期間請多喝開水，以降低腎結石機率。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：暈眩、嗜睡、頭痛、視力模糊、食慾不振、噁心嘔吐。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較嚴重的副作用，請立即就醫，如：嚴重皮膚過敏反應、視力急劇降低或眼球疼痛、急性意識改變或認知功能改變及昏睡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0104

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮