

# 藥品使用指導單

## 滅必治®軟膠囊 (Vepesid® 50 mg)

### ■ 藥品成分名

Etoposide

### ■ 藥品外觀

淡紅紫色，長圓柱形，軟膠囊；大小：2.2 公分

### ■ 作用

為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。

### ■ 用法

- 依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
- 本膠囊應空腹服用，和水整顆吞服，不可嚼食或剝開膠囊。

### ■ 注意事項

- 若您已知對此類藥物過敏，或有胃、肝、腎、心臟疾病，請先告訴您的醫師或藥師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。服用本藥期間不建議哺乳。
- 若您要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。
- 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑、人蔘、銀杏等等，請在服用此藥物前告知您的醫師。
- 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須避免受傷；建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。
- 盡量避免或減少酒精性飲料的攝取，以免影響藥品的代謝及療效。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 使用本藥後可能會造成噁心或嘔吐，以少量多餐的方式進食並且多漱口以加強口腔衛生。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、腹瀉、便秘、咳嗽、發燒、寒顫、喉嚨痛、可逆性落髮、頭暈、頭痛、視力模糊、皮膚或眼睛變黃。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0111

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

