

藥品使用指導單

維泰寧[®]膠囊 (Vistaril[®] 25 mg)

■ 藥品成分名

Hydroxyzine

■ 藥品外觀

深綠/淺綠，長圓柱形，硬膠囊；大小：4 號；標記：[PFIZER][VIS-25]

■ 作用

維泰寧[®]膠囊用於治療焦慮狀態、嘔吐及過敏疾患（蕁麻疹、皮膚炎及搔癢）。

■ 用法

- 緩解精神狀態的不安和緊張症狀相關：成人每日四次，每次 50-100 毫克。
- 緩解過敏症狀相關：成人每日三或四次，每次 25 毫克。
- 飯前或飯後服用皆可。

■ 注意事項

- 若您有心律不整方面之疾病，請先告知醫生或藥師。
- 病患服藥後，可能會產生嗜睡、困倦及全身無力現象，故須小心預防跌倒；從事駕駛、操作機械或複雜性工作者，也需特別小心。
- 授乳婦及孕婦不建議使用本藥。
- 十二歲以下兒童較易出現中樞神經相關之副作用（如痙攣），須謹慎考慮使用。
- 與其他鎮靜藥物併用會加重藥效及副作用，除非必要否則應該避免。
- 服藥期間需避免喝酒。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：口乾、便秘、困倦、暈眩、頭痛、嗜睡、鎮靜。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較嚴重副作用，請立即就醫：發燒、大範圍水腫性紅斑。

■ 藥物過量該怎麼辦？

- 症狀：最常見的表現是過度鎮靜、痙攣、噁心及嘔吐等。
- 處理方式：立刻送醫進行一般性的支持療法並密切觀察病人，此藥物目前沒有特效解毒劑。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0112

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

