

藥品使用指導單

贊安諾[®]錠 (Xanax[®] 0.25 mg)

■ 藥品成分名

Alprazolam

■ 藥品外觀

白色，橢圓形，錠劑；大小：1.0 公分；標記：[UPJOHN；29]

■ 作用

是一種苯二酚（Benzodiazepine）類的藥物，主要用於緩解焦慮及緊張感。

■ 用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

■ 注意事項

- 請勿自行調整藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 使用此藥品請勿吸煙、飲用酒精性的飲料及葡萄柚汁。
- 使用此藥品請勿開車或操縱精密儀器，並小心走路預防可能發生的跌倒。
- 需告知醫生或藥師是否有以下疾病（如：中風、憂鬱症、心臟疾病、青光眼、肝腎疾病、肺及呼吸道疾病、帕金森氏症、癲癇、重症肌無力）。
- 若有服用其他藥物（包括保健食品，尤其是抗黴菌藥物Itraconazole、Ketoconazole）、計劃懷孕（或是已經懷孕）及哺乳婦女或對苯二酚（Benzodiazepine）類過敏者，請先告知醫生或藥師。
- 服用本藥期間不建議哺乳。
- 若需要進行其他手術或牙科處置時，需告知醫生。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩、暫時性的失憶、口乾、便秘等；通常只會出現在治療初期，繼續服用後通常症狀都會漸漸消失。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較嚴重副作用，請立即就醫：憂鬱、睡眠障礙、不安、焦慮、心跳加快、眼睛變黃、講話困難、無法控制肌肉、平衡障礙等。

■ 保存方法

- 儲存於室溫陰涼乾燥處保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0115

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

