

藥品使用指導單

來特平[®]錠 (Zapine[®] 100 mg)

■ 藥品成分名

Clozapine

■ 藥品外觀

淡黃色，圓扁形，錠劑；大小：1 公分；標記：[ST，364]

■ 作用

來特平[®]錠為口服抗精神病製劑，主要適應症為治療其他藥物治療失效的精神分裂症。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 勿自行隨意調整劑量，每個患者均應自最低有效劑量開始使用。
- 如要結束療程，請依照醫師指示，建議在一到兩個星期內逐漸降低劑量，切勿自行停藥。

■ 注意事項

- 若您有計畫（已）懷孕、哺乳、肝或腎功能不全、心血管疾病、癲癇病史之病人，請主動告知您的醫師或藥師。
- 服用本藥不建議授乳。
- 使用本藥可能會影響駕駛和機械操作能力，執行此類動作時請加以注意。
- 使用本藥如果發生任何感染狀況，請立即回診。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：鎮靜、暈眩、便秘、唾液過多、體重增加。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較嚴重副作用，請立即就醫：休息時持續心跳過快或心臟不舒服、眼睛皮膚變黃、高血糖(易渴、多食、多尿)、肌肉僵直、類感冒症狀(發燒、喉嚨痛)等。

■ 注意跌倒之預防

- 服用來特平[®]錠易造成姿勢性低血壓、暈眩、鎮靜、椎體外徑作用(例如震顫，肌肉僵直，混亂、感覺遲鈍、姿勢不穩)，而有跌倒等副作用。
- 服用此藥的期間，需特別注意跌倒的預防，請勿由躺著或坐著突然站立，尤其是初次使用、年老之病患，或是長期服用但劑量增加時。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0117

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮