

藥品使用指導單

美道普膠囊(Madopar[®] HBS 125 mg)

■ 藥品成分名

Levodopa 100mg + Benserazide 25mg

■ 藥品外觀

暗綠/淺青，長圓柱形，硬膠囊；標記：[ROCHE][ROCHE]

■ 作用

控制帕金森氏症

■ 用法

Madopar[®]治療以漸進方式給藥；應個別評估及調整劑量以達適當效果。

■ 注意事項

- 本藥品為持續釋放劑型，必須整顆膠囊吞服。若須磨粉，建議改用 Madopar[®] 250mg錠劑。
- 本藥品應該在飯前至少30分鐘或飯後1小時服用，當此藥與含豐富蛋白質的食物共服時，其療效會降低。
- 腸胃不良反應可能發生在治療初期，可以併用小點心(如：餅乾)、流質食物來控制。
- 本藥品不建議用於肝/腎功能不全、心臟功能異常、精神病、閉角性青光眼、小於25歲的病人。
- 本藥品不能用於孕婦或可能懷孕的婦女。若為哺乳中之婦女因病情需要而服用本品，請暫時停止哺乳。
- 本藥品和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
噁心、咳嗽、頭暈、頭痛、姿勢性低血壓、運動障礙。
- 其他不常見的副作用：
心律不整、嗜睡、幻覺、情緒激動、失眠。
- 如果開始服用美道普錠後，出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0119

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

