

# 藥品使用指導單

## 安閣靈<sup>®</sup>膠囊 (Agrylin<sup>®</sup> 0.5 mg)

### ■ 藥品成分名

Anagrelide hydrochloride

### ■ 藥品外觀

白色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[特殊標記][063]

### ■ 作用

治療原發性血小板過多症。

### ■ 注意事項

- 若您對於此類藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- 若您有心血管疾病、腎或肝功能不良，請告知您的醫（藥）師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師，本藥可能會傷害胎兒，必要時須避孕。
- 若您同時有在服用抗凝血劑、抗心律不整藥品、抗生素(clarithromycin, ciprofloxacin, moxifloxacin等)、止痛消炎藥等，請事先告知您的醫(藥)師。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 若您同時有使用阿斯匹靈或其他影響血液凝結的藥物，可能會增加出血的風險。須留意出血相關症狀(如：吐血、血便或解黑便，或出現不明原因且比平時更常出現的瘀傷時)，嚴重時請立即就醫。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心及嘔吐、腹瀉、胃痛、虛弱、頭暈、頭痛、周邊水腫等。
- 若有下述症狀，請立刻就醫：胸痛、心悸、呼吸急促、雙腿或踝腫大、嘴唇及皮膚呈藍色、吐血、血便。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0125

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮