

藥品使用指導單

利血達®膜衣錠 (Licodin® 100mg)

■ 藥品成份名

Ticlopidine

■ 藥品外觀

白色圓形錠劑；標記：[LC]

■ 作用

抑制血小板凝集並改善血液流動性。適用於中風及栓塞。

■ 用法用量

每日2-5顆，分2-3次服用。

■ 注意事項

- 嚴重肝功能不良、出血、血友病、消化性潰瘍、白球減少症患者，禁止使用。
- 懷孕或哺乳之婦女，請告知醫生。
- 如欲接受手術、拔牙或侵入性檢查(如大腸鏡檢)，請提早兩週告知醫生有在服用此藥，經由醫師評估後決定是否須暫停藥物使用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 頭痛、暈眩、紅疹、噁心、食慾不振、肝臟指數上升。
- 若出現異常出血(如不明瘀青、牙齦出血、鼻出血、血便、血尿)，請停止服用，並即早回診告知醫師。
- 罕見但嚴重之副作用：顆粒球減少症(發熱、咽頭痛、倦怠)、貧血、血小板減少、黃疸(發燒、腹痛、倦怠、皮膚或眼白變黃)。若有以上症狀，請停止服用並即早回診告知醫師。

■ 藥品儲存處置

- 儲存於室溫乾燥處。
- 放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.03

PFS-7200-0127

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮