

藥品使用指導單

福祿多[®]錠 (Farlutal[®] 500 mg)

■ 藥品成分名

Medroxyprogesterone acetate

■ 藥品外觀

白色，長圓柱形，錠劑；大小：2.27 公分；標記：[FCE/500]

■ 作用

福祿多[®]錠為子宮內膜癌的輔助療法，也用於治療停經後婦女之乳癌、攝護腺癌及伴有惡病體質之末期癌症。

■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 一般使用劑量：一天 100~1000 mg，每天分 1~3 次，於固定時間服用。

■ 注意事項

- 有骨質疏鬆、肝、心臟血管疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 本藥有可能容易使血液形成血栓，如果有眼睛症狀或偏頭痛出現時，請立即停藥並告知您的醫師。
- 本藥禁止使用於孕婦，如有懷孕可能或正在授乳，請告知醫生。
- 長期使用本藥可能會造成骨質疏鬆，使用期間請補充鈣質及維生素D。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況且情況嚴重時，請告知醫師：胸痛、體液滯留、體重增加、肌肉痙攣、黃疸伴有搔癢皮疹、乳房痛或溢乳、陰道出血、精神抑鬱、嚴重頭痛、視覺模糊等。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0128

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

