

藥品使用指導單

護腺寧®錠 (Fuprostate® 250 mg)

■ 藥品成分名

Flutamide

■ 藥品外觀

淡黃色，橢圓形，錠劑；大小：1.9 公分；標記：[PBF 397]

■ 作用

護腺寧®錠可抑制雄性激素作用，用於前列腺癌的輔助治療。

■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 一般使用劑量：一次 250 mg，一天 3 次，間隔 8 小時，於固定時間服用。

■ 注意事項

- 有肝臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 本藥會有可能造成貧血，使用期間請留意身體狀況。
- 若您本身有在服用 warfarin，請事先告知您的醫(藥)師。
- 本藥會使皮膚對光敏感，若有嚴重的皮膚症狀出現時(如皮膚發紅、潰爛、大水泡發疹)，請盡快與醫師聯絡。
- 本藥不可用於懷孕期間或哺乳期間，若要使用，請做好避孕。
- 本藥僅供男性病患使用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：男性女乳症、腹瀉、噁心嘔吐、失眠、疲倦。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：皮膚紅腫、潰爛，大水泡的發疹、表皮壞死、黃疸、嚴重肝臟問題、深色尿液等。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0130

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

