

藥品使用指導單

離憂膜衣錠 (Leeyo[®] 10mg)

■ 藥品成分名

Escitalopram Oxalate

■ 藥品外觀

白色，橢圓形，膜衣錠劑，標記：[CCP|158]。

■ 作用

憂鬱症之治療及預防復發。

■ 用法

- 常用劑量為每日 10 毫克，每日劑量不得超過每20 毫克。
- 請遵照醫師指示服藥。

■ 注意事項

- 若您有以下情形，請主動告知您的醫(藥)師：
 - 若您是孕婦、哺乳中婦女、先天性 QT 間隔延長症候群、肝腎功能受損者、癲癇患者、糖尿病患者。
 - 若您對Escitalopram或其它賦形劑過敏。
 - 若您有服用其它藥物或保健食品(包括自行在藥房購買的)。
- 不可用於 18 歲以下之孩童及青少年的治療，因其自殺意圖及憤怒行為之產生較為頻繁，若臨床上需要使用，應謹慎觀察自殺徵象的出現。
- 服用離憂可能會造成異常出血(如：瘀斑、紫斑)，若有併用其他口服抗凝血劑或已知會影響血小板功能的藥物需注意出血情況，若有異常請立即告知您的醫(藥)師。
- 不建議與非選擇性且不可逆的MAO 抑制劑(某些抗憂鬱、抗焦慮藥品)或胃藥(Omeprazole、cimetidine)併用，可能會發生藥物交互作用。
- 不可自行停藥，請遵照醫師指示停藥，否則可能出現戒斷症狀，例如：暈眩、感覺異常、失眠、不安、噁心嘔吐、顫抖、疑惑、發汗、頭痛、腹瀉、心悸、情緒不穩定、易怒，和視力失常。



■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見的副作用：胃口降低或增加、體重增加、焦慮、不安、噩夢、性慾降低、失眠、嗜睡、眩暈、感覺異常、顫抖、噁心、腹瀉、便秘、嘔吐、口乾舌燥、發汗增加、關節痛、肌痛症、疲倦、發熱。
- 其他不常見的副作用：過敏反應、低鈉血症、煩躁、緊張焦躁、恐慌發作、幻覺、靜坐困難、耳鳴、視力障礙、心跳過速或徐緩、鼻出血、腸胃道出血、禿髮、水腫。
- 如果開始服用離憂後出現任何讓您困擾的症狀，請停用離憂並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於25°C 以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.03
- PFS-7200-0131

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮