

藥品使用指導單

普樂可復[®]膠囊 (Prograf[®] 5, 1, 0.5 mg)

■ 藥品成分名

Tacrolimus (FK506)

■ 藥品外觀

5mg：暗粉紅色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[5mg；657]

1mg：白色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[1mg；617]

0.5mg：淡黃色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[0.5mg；607]

■ 作用

普樂可復[®]膠囊為口服的免疫抑制劑，可預防及緩解器官移植後之排斥反應。有時也會用於治療某些自體免疫疾病，如類風溼性關節炎、乾癬等。

■ 用法

- 每隔 12 小時服用一次，盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。切勿擅自停藥或更改劑量。
- 與山喜多 (Cellcept[®]) 併用時，兩者至少相隔 2 小時，以免腸胃不適。

■ 注意事項

- 服藥期間請勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁，以免使得普樂可復[®]膠囊之血中濃度異常升高。
- 必須定期抽血確認藥物血中濃度。一般來說血中低谷濃度大約是5-20 ng/mL。
- 服藥期間免疫力受到抑制，應避免出入人潮多的地方、接觸有感冒或其他感染症的人，並注意個人衛生。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 發現時趕快服用，若距離下次吃藥時間小於4小時以內，則跳過此次，只需按照時間服用下一次藥量，絕對不要服用雙倍藥量。
- 若忘記2劑以上，應與您的醫師聯絡。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 副作用的發生因人而異，若有以下情形，請告訴醫師或藥師：手部顫抖、血壓上升、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、失眠、掉髮等。
- 若服藥後出現過敏反應（呼吸困難、臉部腫脹）、異常瘀青或出血、排尿減少或疼痛、發燒、感覺異常等症狀，請立即就醫。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 藥品交互作用

- 服用普樂可復®膠囊期間未經醫師同意，請勿自行服用其他中草藥、維他命或處方藥物
- 會**增加**普樂可復®膠囊血中濃度之藥品，例如：巨環類抗生素 (Erythromycin、Clarithromycin)，鈣離子通道阻斷劑 (Diltiazem、Verapamil、Nifedipine)，Azole類抗黴菌藥 (Itraconazole、Ketoconazole、Fluconazole)等。
- 會**降低**普樂可復®膠囊血中濃度之藥品，例如：抗癲癇藥 (Carbamazepine、Phenytoin、Phenobarbital)、抗結核菌藥 (Rifampin、Isoniazide)等。
- 會**增加**併用藥物之副作用，例如：保鉀型利尿劑(Spironolactone)、Cyclosporin (Sandimmun Neoral®)。
- 若與含鎂、鋁成分之胃藥一起服用，會降低普樂可復®膠囊之血中濃度，所以使用時需間隔2小時以上。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0133

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮