

藥品使用指導單

癌伏妥[®]錠 (Afinitor[®] 5 mg)

■ 藥品成分名

Everolimus

■ 藥品外觀

白色，長柱形，錠劑；標記：[5][NVR]

■ 作用

- 癌伏妥[®]錠為一種抗腫瘤藥物，一般主要用於停經後晚期乳癌、胰臟神經內分泌腫瘤、晚期腎細胞癌。

■ 用法

- 需以一杯水吞服整顆藥錠，不可咀嚼或咬碎錠劑。
- 應於每天同一時間服用一次，飯前飯後都可以。
- 對無法吞服錠劑的患者，應將癌伏妥[®]錠以輕輕攪拌的方式完全溶散(約7分鐘)於約30毫升開水中，並立即喝下。再於杯中倒入等量的水洗滌，然後將洗滌液全部喝掉，以確保服下完整劑量。

■ 注意事項

- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 有肝、腎臟疾病，或有糖尿病以及高血脂，應告知您的醫（藥）師。
- 有在服用血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)時(如Cabudan[®]、Acertil[®])，應告訴您的醫師，此兩種藥物同時併用有可能會發生血管性水腫(例如：呼吸道或舌頭水腫，可能伴隨呼吸障礙)。
- 盡量避免或減少酒精性飲料的攝取，避免飲用大量葡萄柚汁，以免影響藥品的代謝及療效。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 若您有服用以下藥物，如：Ketoconazole、Erythromycin、Verapamil、Rifampicin等，請在服用這些藥物前告知您的醫師。
- 若您要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若忘記服用**癌伏妥®**，在正常服藥時間後六小時內可以補服。若超過六小時，則應跳過漏掉的劑量，並於隔天原定服藥時間服用。請勿因忘記服藥而一次使用兩倍的劑量。

■ 可能的副作用

- 使用本藥後可能會發生口角炎，請注意口腔衛生並避免使用含酒精成分較為刺激的漱口水。
- 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須小心避免受傷；建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。
- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭痛、口乾、手腳疼痛、水腫、舌頭麻、味覺改變。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。
- 需要服用時，才將鋁箔打開。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0134

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

