

藥品使用指導單

克裏美淨速崩錠 (Kremezin Tab. 2g/包)

■ 藥品成份名

Spherical Absorptive Carbon (活性碳)

■ 藥品外觀

銀色鋁箔包裝，內為黑色圓滑錠劑

■ 作用

藥物或化學品中毒之解毒劑

吸附干擾胃腸道的細菌性毒素、消化性毒素及其他有機性廢物有關症狀

■ 用法用量

- 每次一包(共4錠)，一天三次，於兩餐間服用，頻次依個人情況增減。
- 此錠劑需放入口中以少量水讓其崩解後再吞服。

■ 注意事項

- 建議與其他藥品相隔一個小時使用。
- 便秘、肝臟疾病、正在服用避孕藥、不確定中毒原因之患者，需經醫師評估後才能使用。
- 本藥可能會造成局部刺激，消化性潰瘍或食道靜脈曲張之患者請先詢問醫生再使用。
- 孕婦及哺乳婦女之安全性尚未建立。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 便秘、腹瀉、黑便、腹痛

■ 藥品儲存處置

- 貯於25°C以下。
- 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：Micromedex、藥品仿單
諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130
制訂單位/日期：藥劑部/111.03
PFS-7200-0135

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮