

藥品使用指導單

百無凝[®]膜衣錠 (Brilinta[®] 90 mg)

■ 藥品成分名

Ticagrelor

■ 藥品外觀

黃色、雙凸圓形，錠劑；大小：0.9 cm；標記：[90，T]

■ 作用

百無凝[®]膜衣錠是一種抗血小板藥，可以防止血栓形成，減少血管阻塞的危險。

■ 用法

- 一般每天口服兩次（早晚各一次），依照醫師指示用藥，每天的服藥時間盡量保持固定，可於飯前或是飯後服用。
- 無法吞嚥錠劑之患者可將膜衣錠壓碎後混入水中喝下，該混合藥液亦可透過鼻胃管給藥。

■ 注意事項

- 盡量避免酒精性飲料和葡萄柚汁的攝取，若不確定其他藥品是否會與百無凝[®]產生交互作用時，請詢問醫師或藥師。
- 服藥前，請確實告知醫師是否曾有出血問題（不正常瘀血或流鼻血現象或經期過長）、糖尿病、肝或肺部疾病、高血壓、癲癇、關節炎、甲狀腺機能異常、藥物過敏等問題。
- 若已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。
- 讓所有照顧您的醫療人員知道您正服用此藥。若要動手術，請向醫生諮詢是否需要停藥。自行停藥可能會增加心肌梗塞、中風和死亡的風險。如為了治療出血或重要的外科手術而停用此藥，應向醫師諮詢停用天數並儘快重新開始服用。
- 應盡量避免從事易引起外傷之危險活動。小心使用牙刷或刮鬍刀，盡量選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀。
- 服用本品可能會出現呼吸困難的副作用，通常為輕至中度且會隨時間緩解，倘若症狀持續且加重請盡速告知醫師。
- 若不小心服用過量，請立即告知您的主治醫師或就近就醫。
- 若有不正常出血情況（如鼻出血、糞便顏色突然變深或刷牙有血絲等），請立即告知您的主治醫師或就近就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處（30℃以下）、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0137

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

