

# 藥品使用指導單

## 拜瑞妥®膜衣錠 (Xarelto® 2.5/10/15 mg)

### ■ 藥品成分名

Rivaroxaban

### ■ 藥品外觀

■ Xarelto 2.5 mg：淡黃色，圓形，膜衣錠；標記：[Xa][▽2.5]

Xarelto 10 mg：淡紅色，圓形，錠劑；大小：0.6公分；標記：[Bayer][▽10]

Xarelto 15 mg：紅色，圓型，雙面突起膜衣錠，標記：[Bayer][▽15]

### ■ 作用

拜瑞妥®膜衣錠是一種抗凝血劑，可以防止血栓形成，減少血管阻塞的危險；可預防中風及全身靜脈栓塞、治療或預防深部靜脈血栓及肺栓塞、預防下肢重大骨科手術後的靜脈血栓栓塞症。

### ■ 用法

■ 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。

■ 請隨餐服用。

■ 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次；無法吞嚥錠劑之患者可將膜衣錠壓碎後混入水中喝下，該混合藥液亦可透過鼻胃管給藥。

### ■ 注意事項

■ 請讓所有照顧您的醫療人員知道您正服用此藥，特別是要進行任何手術或任何侵入性治療前。

■ 在任何情況下(包含拔牙及手術)，若沒有事先與原開藥醫師討論，不得自行停用此藥品，因為可能增加您出現血栓與中風的風險。

■ 盡量避免酒精性飲料和葡萄柚汁的攝取。若不確定其他藥品是否會與拜瑞妥產生交互作用時，請詢問醫師或藥師。

■ 服藥前，請確實告知醫師是否曾有出血問題(不正常瘀血或流鼻血現象或經期過長)、肝腎疾病、藥物過敏等問題。

■ 若已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。

■ 應盡量避免從事易引起外傷之危險活動。小心使用牙刷或刮鬍刀，盡量選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀。

■ 若有不正常出血情況(如鼻出血、糞便顏色突然變深或刷牙有血絲等)，請立即告知您的主治醫師或就近就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



## ■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：腹瀉、噁心嘔吐、失眠、疲倦、頭暈頭痛。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：皮膚紅腫、潰爛、大水泡的發疹、表皮壞死、黃疸、嚴重肝臟問題等。

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果在預計服藥時間未服用本品，則於同一天內儘速服用，並於隔日依原定時間服用一次。
- 若不小心服用過量，請立即告知您的主治醫師或就近就醫。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處（30℃以下）、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.08, 111.10 修
- PFS-7200-0138

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

