

# 藥品使用指導單

## 斥消靈<sup>®</sup>錠 (Rapamune<sup>®</sup> 1 mg)

### ■ 藥品成分名

Sirolimus

### ■ 藥品外觀

白色，三角形錠劑，標記：[ RAPAMUNE 1 mg ]

### ■ 作用

與 Cyclosporine(Sandimmun<sup>®</sup> 新體睦<sup>®</sup>) 及皮質類固醇合併使用來預防病人腎臟移植後之器官排斥。

### ■ 用法

- 每天口服一次，依照醫師指示用藥，切勿擅自停藥或更改劑量。
- 由於食物會影響藥物的吸收，所以每天的服藥時間必須固定，維持與食物併用或空腹時服用，不可一下空腹時服用，一下子又改為與食物併用。
- 如果需同時服用 Sandimmun<sup>®</sup>(新體睦<sup>®</sup>) 時，本藥應在新體睦<sup>®</sup>服用後四小時才可服用。

### ■ 注意事項

- 服用斥消靈<sup>®</sup>錠請配大量開水整粒吞服，不可壓碎、咀嚼或剝半。
- 服藥時，請勿與含葡萄柚汁的飲料併服。
- 為使藥品達到最佳療效及減少副作用，服藥期間醫師會視情況定期監測腎功能及藥品血中濃度（一般為服藥前濃度）。
- 許多的藥物、保健食品、中草藥會增加或降低本藥的藥效，所以使用本藥前請先告知醫生您正在使用的處方藥或非處方藥。
- 在戶外時應穿著防曬的衣服和使用高防曬係數的廣效域防曬油，以避免日光及紫外線的暴曬。
- 服用本類藥品會使您的抵抗力較弱，因此應避免和有感染的人接觸。如有任何類似感冒症狀如發燒、喉嚨痛、發冷等，請立即就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

- 服用此藥請勿授乳；服用此藥應避免懷孕，若可能懷孕請告知醫生，建議婦女服用本藥期間及停止治療後十二周內應採有效的避孕措施。
- 在服用本藥期間必須避免接種活菌疫苗，如麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、德國麻疹疫苗、口服沙賓疫苗、卡介苗、黃熱病疫苗、水痘疫苗和TY21a型傷寒疫苗，以免使疫苗效力下降。

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若在 12 小時以內想起時請儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間則不必補服上次劑量，照原來時間服用當次的劑量。
- 絕不可一次服用雙倍劑量。
- 如忘記兩劑以上，請告知醫生。

## ■ 可能的副作用

症狀	如何處理
胸痛、發燒、發冷、喉嚨痛、四肢水腫、暈眩、呼吸困難、不尋常出血或瘀血、血尿、血便、黑便、皮膚紅腫、癢、痛等過敏反應	請立即就醫
腹瀉、便秘、嘔吐、消化不良、頭痛、關節痛、輕微皮疹	若症狀持續且嚴重時，立刻與醫師聯繫
血脂肪升高	可以持續使用，由醫生決定是否需要調整劑量，或加服降血脂藥

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0142

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

