

# 藥品使用指導單

## 腦思坦內服溶液用顆粒劑(Hamgo Granule)

### ■ 藥品成份名

Piracetam

### ■ 藥品外觀

黃色顆粒劑

### ■ 作用

腦血管障礙及老化所引起的智力障礙、皮質性陣發性抽搐。

### ■ 用法用量

- 腦血管障礙及老化所引起的智力障礙：每日1-2包，至多一天四包。
- 皮質性陣發性抽搐：一天6包，最多一天20包。
- 將顆粒倒入約50mL的水，完全溶解後服用。

### ■ 注意事項

- 腦內出血、末期腎臟疾病患者禁止使用。
- 腎功能不良者需調整劑量。
- 開始服藥期間，無法確定身體對藥物的反應，因為服用本藥後，可能會有嗜睡、頭暈、疲倦、走路不穩，請避免需注意力集中活動（例如：駕車、操作重機械或其他危險活動）。
- 同時併用甲狀腺素激素(如:Eltroxin)，可能會產生睡眠障礙之現象。
- 孕婦及或計畫懷孕者，就診時請務必告知醫師。
- 此藥物會分泌到乳汁，因此哺乳婦女應避免使用此藥；或請於用藥期間停止授乳。
- 含有阿斯巴甜賦形劑，酮尿症患者不宜使用。
- 會影響血小板凝集，若要動手術請務必告知醫師有在服用此藥。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 暈眩、腹痛、腹瀉、噁心嘔吐、過敏、皮膚炎、失眠、頭痛、焦慮

## ■ 藥品儲存處置

- 貯於25°C以下。
- 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.03

PFS-7200-0147

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮