

藥品使用指導單

憶思能[®]膠囊 (Exelon[®] 1.5/3/4.5 mg)

■ 藥品成分名

Rivastigmine

■ 藥品外觀

Exelon 1.5mg：淡黃橙，長圓柱形，硬膠囊；標記：[EXELON 1.5mg]

Exelon 3mg：黃色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[EXELON 3.0mg]

Exelon 4.5 mg：棕色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[EXELON 4.5mg]

■ 作用

憶思能[®]膠囊為腦部選擇性的乙醯膽鹼酯抑制劑，用於治療輕至中度阿滋海默氏病之失智症，以及與帕金森氏症相關的輕中度失智症。

■ 用法

每次1.5-6 mg，一天兩次。飯後使用或與食物併服。

■ 注意事項

- 患有胃潰瘍、排尿困難、氣喘、肺阻塞、心臟疾病或嚴重肝功能受損的病人，應謹慎使用並於服藥期間密切留意身體狀況。
- 憶思能可能會誘發或惡化錐體外症候群(如：眼球上吊、牙關緊閉、嘴巴歪斜、靜坐不能、身體不由自主地抖動...等)，請於服藥期間密切留意身體狀況，若有異常請盡速告知醫療人員。
- 孕婦或哺乳婦女，請先告知醫師。
- 憶思能與某些藥物(如：擬膽鹼作用劑、抗膽鹼作用劑等)可能會產生交互作用，服藥前請主動諮詢醫療人員之專業意見。
- 服用本藥可能造成疲倦，駕車或操作複雜器械應謹慎。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不佳、頭暈、躁動、疲倦、體重減輕。
- 使用憶思能治療帕金森氏症之失智症，有可能會使帕金森氏症惡化，請於服藥期間密切留意身體狀況，若有異常請盡速告知醫療人員。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30 °C以下)。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0152

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮