

藥品使用指導單

氧化鎂[®]錠 (MgO[®] 250 mg)

■ 藥品成分名

Magnesium Oxide

■ 藥品外觀

白色，圓凸形；標記：[SK，MGO]

■ 作用

中和胃酸、軟便。

■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 請於固定時間服用。

■ 注意事項

- 若您為懷孕婦女請告知您的醫生及藥師。
- 哺乳婦女服用本品期間可以正常哺乳。
- 本藥會有可能造成腹瀉，使用期間請務必補充適當水分，或應先停藥，並與醫療人員確認是否可繼續使用本藥。
- 本藥可能會干擾部分抗生素等藥品吸收，若需與其他藥物併服，請務必與藥師確認。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：腹痛、腹脹，噁心等症狀。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：肌肉無力、意識不清、嚴重腹瀉、血便等問題。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0153

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮