

藥品使用指導單

加利美粉 (Kalimate)

■ 藥品成份名

Ca.polystyrene sulfonate

■ 作用

高血鉀用藥。

■ 用法用量

- 成人通常每日3-6包，分成2-3次，依症狀適宜增減。
- 加30-50cc的冷開水泡成懸浮液服用，服藥後請喝大量的水。
- 請與其它藥物間隔2小時以上服用。
- 請勿與果汁混合使用。

■ 注意事項

- 若有下述病史，請告知醫生，並謹慎使用。
 - 便秘、腸管狹窄、消化道潰瘍、副甲狀腺機能亢進、多發性骨髓瘤
- 此藥物可能會增加毛地黃(Digoxin)之毒性，有在服用Digoxin成分藥品(如:Lanoxin®隆我心錠)之患者，請主動告知醫生。
- 含有鈣、鎂、鋁製劑之制酸劑或緩瀉劑，會降低加利美粉的效果，請間隔兩小時再服用。
- 服用此藥物期間，請密切留意排便之狀況(尤其是老年患者)。
- 此藥物使用於孕婦及哺乳婦女之安全性尚未確立，務必請醫師衡量利弊。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 噁心、嘔吐、便秘、噁心、食慾降低、低血鉀(嗜睡、意識改變、多尿)、腹脹等
- 若副作用越來越嚴重且無法緩解，請停藥並即早回診告知醫師。

■ 藥品儲存處置

- 貯於25°C以下。
- 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/110.08, 111.10 修

PFS-7200-0157

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮