

# 藥品使用指導單

## 普栓達®膠囊 (Pradaxa® 110 mg)

### ■ 藥品成分名

Dabigatran etexilate

### ■ 藥品外觀

藍色膠囊；大小：2公分；標記：[商標/R110]

### ■ 作用

普栓達®膠囊是一種抗凝血劑，可以防止血栓形成，減少血管阻塞的危險。

### ■ 用法

- 通常每天兩次，每次一顆。
- 可以空腹或飯後服用均可，但應整顆吞服不建議弄破、咀嚼或取出膠囊內藥粒，未整顆吞服可能增加出血風險。
- 不可自行更改劑量或自行停藥。

### ■ 注意事項

- 進行任何手術或任何侵入性治療前，請務必先告知您的醫師，您正在服用此藥品。
- 在任何情況下(包含拔牙及手術)，若沒有事先與原開藥醫師討論，不得停用此藥品，因可能增加您出現血栓與中風的風險。
- 服藥前，請確實告知醫師是否曾有出血問題（不正常瘀血或流鼻血現象或經期過長）、肝腎疾病、藥物過敏等問題。
- 請告知醫師您目前正在服用的其它藥物，因為其他藥物可能會影響本藥藥效。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，應告知您的醫生及藥師。
- 應盡量避免從事易引起外傷之危險活動；避免割傷自己，小心使用牙刷或刮鬍刀，盡量選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀。
- 若有不正常出血情況（如鼻出血、糞便顏色突然變深或刷牙有血絲等），請立即告知您的主治醫師或就近就醫。
- 讓所有照顧您的醫療人員知道您正服用此藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。但若距離下一次服藥時間小於6小時，則跳過該劑量不要服用。
- 切勿為了補服錯過的一劑，而將下一劑的劑量加倍。

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿驚慌：胃痛、噁心、消化不良、腹瀉。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：皮膚發疹、眼臉腫脹、呼吸困難、血尿、血便或黑便、胸痛、呼吸短促、咳血、經常流鼻血、下肢疼痛、異常出血或瘀傷，請立即就醫。

## ■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 其膠囊必須儲存於原裝鋁箔中。如使用藥盒，應連同原裝鋁箔儲存於藥盒內，切勿將膠囊取出，以免藥物因受潮而影響藥效。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0158

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

