

藥品使用指導單

康立來[®]錠 (Coralan[®] 5 mg)

■ 藥品成分名

Ivabradine

■ 藥品外觀

淺橙色之橢圓形膜衣錠，標記：[5][特殊標記]

■ 作用

康立來[®]透過降低心跳來減輕心臟的負擔，進而達到治療慢性心臟衰竭的目的。

■ 用法

- 常用劑量為每日2次，早、晚服用，每次0.5或1顆。
- 醫師會根據目前的治療藥物、治療效果與病人對藥物的耐受性進行個人化的調整，因此請按醫囑服藥，勿自行增減藥量或任意停藥。

■ 注意事項

- 如果有肝功能異常、低血壓、心跳不規律等情況，請務必告知醫師。
- 若您有在服用其他心臟用藥，請告知您的醫師。
- 康立來[®]不建議使用於孕婦及哺乳婦女。若您計畫懷孕或已經懷孕，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
- 服用此藥物期間請避免服用葡萄柚/葡萄柚汁或柚子。
- 請記錄血壓及心跳並定期回診，以利醫師評估藥物反應並進行相關檢查。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 康立來®常見的副作用有頭痛、光幻覺(視野內突然出現短暫的強光)、視力模糊、心跳緩慢及心律不整。
- 如果開始服用康立來®後出現任何讓您困擾的症狀，請立即停用並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.01
- PFS-7200-0160

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮