

藥品使用指導單

恩特來®錠 (Inderal® 10 mg)

■ 藥品成分名

Propranolol

■ 藥品外觀

粉紅色，圓扁形，錠劑；大小：0.65公分；標記：[INDERAL，10]

■ 作用

- 治療狹心症、心律不整(上室性不整律、心室性心搏過速)、原發性及腎性高血壓、偏頭痛、原發性顫抖、焦慮性心搏過速、甲狀腺毒症的輔助劑、親鉻細胞瘤。

■ 用法

- 劑量及用法因人及病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 請於固定時間搭配開水服用，本藥宜與食物共服。

■ 注意事項

- 孕婦使用此藥物前應由醫師衡量利弊。
- 此藥物會少量排泄於乳汁中，哺乳婦使用前應由醫師衡量利弊。
- 若遇Propranolol與其他心血管藥物(如:Clonidine) 治療轉換之狀況，請於治療調整期間密切注意血壓及心律變化。
- 本藥可能會造成血糖變化，請糖尿病患者於服用此藥期間注意血糖變化。
- 若有下列病史，請主動告知醫師
 - 充血性心臟衰竭、糖尿病、氣腫或非過敏性支氣管炎、肝、腎功能障、Raynaud's 症(雷諾氏症)、末梢血管疾病及甲狀腺機能異常疾病

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 眩暈、心跳變慢、呼吸困難、嘔吐、皮膚發疹、幻覺、頭痛等
- 若副作用越來越嚴重且無法緩解，請停藥並即早回診告知醫師。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0163

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

