

藥品使用指導單

服利寧[®]錠(Frisium[®] 10mg)

■ 藥品成分名

Clobazam

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：0.5公分；標記：[B；GL]

■ 作用

焦慮狀態、癲癇之輔助治療。

■ 用法用量

服利寧[®]錠必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。

■ 注意事項

- 對苯二酚 (Benzodiazepine) 類過敏者須在使用前告知醫生。
- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 使用此藥品前請勿吸煙、喝含酒精性的飲料及葡萄柚汁。
- 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
- 開始服藥期間，無法確定身體對藥物的反應，因為服用本藥後，可能會嗜睡、頭暈、疲倦、走路不穩，請避免需注意力集中的活動（例如：駕車、操作重機械或進行其他危險活動）。
- 若有服用其他藥物(包括保健食品)請先告知醫生或藥師。
- 若有計劃懷孕(或已懷孕)及哺乳婦女者，請先告知醫生。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■可能的副作用

副作用	症狀	如何處理
很常見 (≥10%)	流口水、嗜睡、攻擊性行為、發燒	若症狀持續未改善且影響生活，請與醫師聯繫
≥ 1% 至 < 10%	食慾降低、易怒、憂鬱、躁動、困倦、鎮靜、頭昏眼花、注意力不集中、說話障礙、頭痛、顫抖、運動失調、口乾、噁心、便秘、疲勞	
嚴重	嚴重的皮膚反應，例如：史蒂文生氏-強生症候群 (SJS) 及毒性表皮溶解症 (TEN)、呼吸抑制、肌肉無力、自殺意圖	請立即就醫

■保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 110.07, 111.10 修
- PFS-7200-0165

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

