

藥品使用指導單

佐能安[®]錠(Zonegran[®] 100 mg)

■ 藥品成分名

Zonisamide

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：1.3公分；標記：[P/132]

■ 作用

成人局部癲癇發作之輔助治療。

■ 用法用量

- 佐能安[®]錠必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥，每日最高劑量為500 mg。
- 本品空腹或隨餐服用均可。
- 避免自行停藥，突然停藥可能引起癲癇發作，或增加發作頻率。
- 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。

■ 注意事項

- 對zonisamide或磺胺類藥物(sulfonamides)過敏者，請勿使用此藥。年長者服用本藥，請特別注意副作用及跌倒的風險。
- 服用zonisamide後曾引發嚴重的皮疹，包括史蒂文生氏-強生症候群。(Stevens-Johnson Syndrome)，若您服藥後出現不明原因的疹子、皮膚紅腫、水泡或脫皮現象，請立即停用zonisamide並就醫。
- 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有肝病、憂鬱症、腎臟病及正服用其他藥物或曾有藥物不良反應（抗癲癇藥）者，請先告知您的醫師。
- 服用本品有可能會讓您的排汗減少與體溫升高，請適時的補充水分並避免暴露於高溫環境下，特別是孩童患者。
- 藥物交互作用 Orlistat 羅氏鮮, Ginkgo 銀杏。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■可能的副作用

副作用	症狀	如何處理
很常見 (≥10%)	厭食、激動、易怒、混淆狀態、憂鬱、運動失調、頭暈、記憶力減退、嗜睡、複視	若症狀嚴重時(影響生活)，請與醫師聯繫
嚴重	嚴重的皮疹，包括史蒂文生氏-強生症候群(SJS)、自殺意念與行為、嚴重免疫不良反應，包括皮疹、過敏反應及重大血液障礙(包括再生不良性貧血)、急性近視及次發性隅角閉鎖型青光眼、代謝性酸中毒	請立即就醫

■保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 110.07, 111.10 修
- PFS-7200-0166

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮