

藥品使用指導單

維帕特®錠 (Vimpat® 100mg)

■ 藥品成分名

Lacosamide

■ 藥品外觀

黃色橢圓錠；標記: [SP|100]

■ 作用

四歲以上

- (1) 複雜性局部癲癇發作
- (2) 單純或複雜性局部發作合併有次發性全身發作癲癇之輔助治療

■ 用法用量

- 維帕特®錠必須維持體內固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
- 飯前或飯後服用藥物均可。
- 請勿自行停藥，停藥可能引起癲癇或增加癲癇發作的頻率。

■ 注意事項

- 若您本身有心臟疾病、肝腎功能不全者，請事先告知您的醫師。
- 服用本藥後，可能會有嗜睡、頭暈、疲倦、走路不穩等反應，剛開始服藥時，請盡量避免需集中注意力的活動（例如駕車、操作重機械或其他危險活動）
- 服藥後，如出現情緒不穩、自殺傾向、異常的行為或情緒反應，請與醫師討論。
- 如有出現皮膚紅疹或全身性過敏或心跳異常請告知醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■可能的副作用

副作用	症狀	如何處理
很常見 (≥10%)	頭暈、頭痛、噁心、複視	若症狀嚴重時(影響生活)請與醫師聯繫
嚴重	自殺意念和行為、心臟節律和傳導問題、藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀(DRESS)、史蒂文生氏-強生症候群(SJS)、毒性表皮溶解症(TEN)、血管水腫、顆粒性白血球缺乏症	請立即就醫

■保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/110.07, 111.10 修
- PFS-7200-0167

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮