

藥品使用指導單

癲控達®膜衣錠(Fycompa® 2mg)

■ 藥品成分名

Perampanel

■ 藥品外觀

橘色圓形錠劑,標記【E275 2】

■ 作用

用於12歲以上青少年及成人患者，局部癲癇發作併有或未併有續發型全身發作，或原發型全身性強直陣攣癲癇發作併有原發性全身發作之治療。
(癲癇用藥)

■ 用法用量

- 癲控達®膜衣錠必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
- 癲控達®膜衣錠請整粒吞服，空腹或飯後服用皆可。
- 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。

■ 注意事項

- 開始服藥期間，無法確定身體對藥物的反應，因為服用本藥後，可能有嗜睡、頭暈、疲倦、走路不穩，請避免需注意力集中活動（例如：駕車、操作重機械或其他危險活動）。
- 年長者服用本藥，請特別注意副作用及跌倒的風險。
- 服用本藥，請不要喝含酒精的飲料，以免增加中樞神經抑制副作用。
- 有憂鬱病史者，服用本藥品可能會加重憂鬱、自殺意念或情緒行為問題
- 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
- 本藥若併用含有黃體素之賀爾蒙避孕藥時，可能會降低避孕藥的效果，建議用其他避孕方式或與醫師討論。
- 若有服用其他藥物(包括保健食品)請先告知醫生或藥師。
- 若有計劃懷孕(或已懷孕)及哺乳婦女者，請先告知醫生。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■可能的副作用

副作用	症狀	如何處理
很常見 (≥10%)	頭暈、嗜睡	若症狀嚴重時(影響生活)請與醫師聯繫
≥1% 至 <10%	食慾減退、食慾增加、攻擊行為、易怒、焦慮、混淆狀態、運動失調、構音困難、平衡障礙、複視、視覺模糊、眩暈、噁心、背痛、步態異常、倦怠、體重增加、跌倒	若症狀持續未改善且影響生活，請與醫師聯繫
嚴重	嚴重精神及行為反應(敵意及攻擊性)、自殺意念與行為、藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀(DRESS)	請立即就醫

■保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 110.07, 111.10 修
- PFS-7200-0168

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

