

藥品使用指導單

必治癲[®] 膜衣錠(Briviact[®] 50mg)

■ 藥品成分名

Brivaracetam

■ 藥品外觀

黃色卵形膜衣錠，標記【u50】

■ 作用

適用於4歲以上局部癲癇發作病人的治療

■ 用法用量

- 必治癲[®] 膜衣錠必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
- 本品可於空腹或進食後服用。

■ 注意事項

- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 使用此藥品前請勿吸煙、喝含酒精性的飲料及葡萄柚汁。
- 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
- 剛開始服藥期間，因尚無法確定身體對藥物的反應，本藥可能會造成嗜睡、頭暈、疲倦、走路不穩等情形，請盡量避免需注意力集中的活動（例如：駕車、操作重機械或其他危險活動）。
- 若有服用其他藥物(包括carbamazepine, phenytoin, rifampin或保健食品等)請先告知醫生或藥師。
- 若有計劃懷孕(或已懷孕)及哺乳婦女者，請先告知醫生。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■可能的副作用

副作用	症狀	如何處理
很常見 (≥10%)	暈眩、嗜睡	若症狀嚴重時(影響生活)請與醫師聯繫
≥ 1% 至 < 10%	疲勞、行為或精神失常、無力及 眼球震顫等	若症狀持續未改善 且影響生活，請與 醫師聯繫
嚴重	自殺行為及意念、神經系統不良 反應(嗜睡、疲倦、暈眩及協調 障礙)、精神方面不良反應(行 為改變與精神病症狀)、過敏反 應(支氣管痙攣及血管性水腫)	請立即就醫

■保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 110.07, 111.10 修
- PFS-7200-0169

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮