

藥品使用指導單

諾瑞心寧®持續性藥效錠 (Rancad® 500 mg)

■ 藥品成分名

Ranolazine

■ 藥品外觀

橘色橢圓形錠劑；標記：[L31][LU]

■ 作用

治療穩定性心絞痛

■ 用法

- 常用劑量為每次一顆，每日兩次，之後依其臨床症狀，必要時可增加至每次兩顆，每日兩次。
- 諾瑞心寧®錠可與食物或不與食物併服；且此藥應整顆吞服，不可壓碎、折斷或嚼碎。

■ 注意事項

- 本品只用於預防或緩解心絞痛，無法用於解除心絞痛的急性症狀。
- 若您同時有在併服其他心臟血管用藥、口服抗黴菌藥物、紅黴素或抗病毒藥品等，請事先告知醫師。
- 若您有心臟節律相關疾病或是肝功能不全，請事先告知醫師，以利醫師評估是否可使用此藥品，並適時進行例行追蹤檢查。
- 不建議使用於孕婦及哺乳婦女。若您計畫懷孕或已經懷孕，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
- 服用此藥物期間請避免服用葡萄柚/葡萄柚汁、柚子或飲酒。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請跳過本次劑量，並按下一次劑量服用即可，切勿不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 最常見的副作用為暈眩（6.2%）、頭痛（5.5%）、便秘（4.5%）及噁心（4.4%）。
- 如果開始服用諾瑞心寧[®]錠後出現任何讓您困擾的症狀，請盡速與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 /110.05, 111.10 修
- PFS-7200-0171

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮