

藥品使用指導單

服腦清錠 (Fluzine® 5 mg)

■ 藥品成分名

Flunarizine

■ 藥品外觀

淡黃色，圓扁形錠劑；大小：0.80公分；標記：[STD，136]

■ 作用

預防頭痛眩暈、末梢血管循環障礙

■ 用法

成人劑量通常為每日一至二次，每次一錠，依個別狀況調整劑量。

■ 注意事項

- 懷孕婦女不建議使用本品；若為哺乳之婦女因病情需要而服用本品，請暫時停止哺乳。
- 少數患者會在本藥治療期間發生逐漸加劇的倦怠情形，若有此狀況發生請先停用藥品並及早與您的醫師討論。
- 本藥可能會產生嗜睡的現象，特別是在治療初期，所以駕車或操作危險機械務必小心留意；若同時與鎮靜安眠藥物併用也可能會增加鎮靜的現象，請多加留意有無過度鎮靜的情況發生。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 常見副作用：
嗜睡及疲倦(大多為暫時性)、食慾增加或體重增加。
- 較不常見副作用：
抑鬱、錐體外症狀(如：運動遲鈍、靜坐不能、口部及顏面震顫等)、口乾、噁心及胃痛等。
- 如果開始服用福腦清®錠後出現任何讓您困擾的症狀，請暫服藥品並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.03
- PFS-7200-0173

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

