

藥品使用指導單

適尿通軟膠囊 (Avodart 0.5mg)

■ 藥品成份名

Dutasteride

■ 藥品外觀

暗黃色，不透明長橢圓形軟膠囊；標記：[GX CE2]

■ 作用

治療前列腺肥大症。

■ 用法用量

- 成人一天1顆

■ 注意事項

- 需整顆吞服，切勿嚼食或將膠囊打開；直接接觸膠囊內容物可能會對口咽部黏膜造成刺激。
- 不適用於女性及兒童。
- 此成分可經由皮膚吸收，婦女及小孩應避免接觸到裂損的膠囊，若婦女接觸到此成分可能會對男性胎兒造成胎兒異常風險。若接觸到裂損的膠囊，請立即以肥皂及水清洗接觸處。
- 腎功能不全病患不需調整劑量；肝功能不全病患請經由醫師評估再使用。
- 避免與cimetidine, ciprofloxacin, diltiazem, ketoconazole, ritonavir, verapamil等藥品併服，避免影響其代謝，加重副作用。
- 停止服用適尿通軟膠囊®後的六個月內避免捐血。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 射精困難、性慾降低；罕見：水腫、過敏

■ 藥品儲存處置

- 貯於30°C以下。
- 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位 / 日期：藥劑部/111.03

PFS-7200-0175

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮