

藥品使用指導單

倍鬆錠(Befon® 5 mg)

■ 藥品成分名

Baclofen

■ 藥品外觀

白色，圓扁形錠劑；標記：[B/Lo]

■ 作用

中樞性之肌肉鬆弛

■ 用法

初始劑量為一天三次飯後服用，每次一錠，並依個別狀況調整劑量，最大劑量可上調至80毫克/天(分成1~3次)。

■ 注意事項

- 對本品成分及其賦形劑過敏者，禁止使用本品。
- 懷孕婦女不建議使用本品；若為哺乳中之婦女因病情需要而服用本品，請暫時停止哺乳。
- 肝/腎功能不全者，請事先告知醫師。
- 請盡量不要突然停藥，宜逐漸減少劑量，來避免斷藥後可能產生的幻覺、錯亂、痙攣發作等狀況。
- 由於本品可能會有嗜睡或暈眩的現象，駕車或操作危險機械的患者服用本品請小心留意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
噁心、嘔吐、食慾不振、鎮靜、倦怠感、頭痛、排尿困難等。
- 其他不常見不良反應包括：
呼吸困難、癲癇、低血壓、肝功能數值上升等。
- 如果開始服用倍鬆錠後，出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0176

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

