

藥品使用指導單

胃可麗®錠 (Wecoli® 10mg)

■ 藥品成分名

Bethanechol chloride

■ 藥品外觀

白色，圓扁形錠劑，標記：[YP 115]

■ 作用

促進泌尿道及消化道平滑肌收縮，故可改善尿液滯留及恢復腸胃蠕動。

■ 用法用量

成人劑量一日10-50mg，分3-4次服用。建議空腹服用。

■ 注意事項

- 若您有以下情形，請告知您的醫(藥)師：
 - 孕婦、哺乳中婦女。
 - 若您對本藥成份或其他賦形劑過敏者。
 - 甲狀腺機能過高、胃潰瘍、氣喘、心搏過慢、冠狀動脈疾病、癲癇、泌尿道或胃腸機械性阻塞等患者。
 - 若您有服用其他藥物或保健食品(包括自行在藥房購買的)。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見的副作用為腹部不適、腹瀉、尿急、流涎、噁心嘔吐、皮膚潮紅、發汗及姿勢性低血壓。
- 若出現上述情況且持續加重，請立即與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於避光、室溫乾燥處。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/112.05
- PFS-7200-0177

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

