

藥品使用指導單

卡菲蒂羅[®]錠 (Carvedilol[®] 6.25, 25 mg)

■ 藥品成分名

Carvedilol

■ 藥品外觀

Carvedilol 6.25mg：黃橙色，不規則形；大小：0.5公分；標記：[C2]

Carvedilol Hexal 25mg：白色、不規則狀；大小：1.2公分；標記：[C4]

■ 作用

治療高血壓、鬱血性心衰竭、心肌梗塞。

■ 用法

- 用法及劑量因人而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 請於固定時間搭配開水服用，可於餐前或餐後服用。

■ 注意事項

- 有支氣管痙攣的慢性阻塞性肺病(COPD)但未服口服或吸入性藥物的患者，應小心使用，且僅當治療效益大於危險性時方可使用。
- 本藥會有可能造成低血壓，使用期間請定時量測血壓，以利醫療人員評估與追蹤。
- 本藥會與其他降壓藥產生交互作用，若有需增加其他降壓藥物請務必諮詢醫師或藥師。
- 服用Carvedilol需長期性的治療，不應突然停止治療而應以星期為間隔逐漸調整療程，此對併有冠狀心臟疾病的病人尤其重要。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 暈眩、頭痛、疲倦、心跳過慢、姿勢性低血壓和罕見的暈厥，通常是輕微的且發生於治療的初期。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0179

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

