

藥品使用指導單

昂特欣[®]錠 (Eltroxin[®] 50 mcg)

■ 藥品成分名

Levothyroxine sodium

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；標記：[50] [GS 11E]

■ 作用

治療甲狀腺機能不足。

■ 用法

- 成人：初始劑量每日50-100mcg，逐漸調整直至正常代謝功能維持穩定為止，此時每日劑量可能須達到100-200mcg。
- 兒童：醫師會根據年齡、體重計算，並因應臨床反應及檢驗數值進行調整。
- 建議於早餐前30-60分鐘空腹服用。

■ 注意事項

- 對本品所含任何成份過敏或甲狀腺中毒症者，禁止使用。
- 老年患者、有心肌機能不全症狀、心肌梗塞或局部缺血、糖尿病或尿崩症患者，用藥需特別小心，請於服用昂特欣錠期間密切留意身體狀況。
- 若有在服用抗凝血劑、抗癲癇藥(如carbamazepine及phenytoin)、強心劑、類交感神經劑、避孕藥等藥品，需先告知醫師。
- 分泌到乳汁的甲狀腺素濃度極低，但可能會干擾新生兒甲狀腺機能的篩檢。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：過敏反應、腹瀉、噁心、嘔吐、心悸、出汗、體重下降、落髮、疲勞、失眠、焦慮。
- 如果服藥後出現任何讓您困擾的症狀，請先停用並提早回診告知醫師。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.03
- PFS-7200-0180

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮