

藥品使用指導單

可諾通膜衣錠 (Clopidogrel 75mg)

■ 藥品成份名

Clopidogrel

■ 藥品外觀

淡紅，圓形，錠劑；大小：0.9公分；標記：[PL/T20]

■ 作用

預防血栓形成

■ 用法用量

- 成人每天1顆

■ 注意事項

- 嚴重肝功能不良、消化性潰瘍或顱內出血之患者，禁止使用。
- 懷孕或哺乳之婦女，不建議使用。
- 此藥會延長出血時間，如欲接受手術、拔牙、檢查(如大腸鏡檢)，需事先告知醫生有在服用此藥，並請原開藥醫生評估是否需停用此藥。
- 若有在服用Rifampicin、omeprazole、抗憂鬱藥品之患者，請告知醫生，避免影響可諾通錠®之效果。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 胃腸不適、頭痛、肌肉酸痛、不正常出血。
- 若出現不正常出血(如不明瘀青、牙齦出血、流鼻血、血便、血尿)，請立即停止服用，並回診或至急診做相關處置與評估。

■ 藥品儲存處置

- 貯於25°C以下。
- 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.03

PFS-7200-0181

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮