

藥品使用指導單

諾康停錠 (Comtan® 200 mg)

■ 藥品成分名

Entacapone

■ 藥品外觀

橙褐色，卵形雙凸的膜衣錠；大小：1.74公分；標記：[COMTAN]

■ 作用

併用Levodopa/Benserazide或者Levodopa/Carbidopa兩類藥品治療帕金森氏症。

■ 用法

- Entacapone僅能與levodopa/benserazide或levodopa/carbidopa併用。
- 請遵照醫師開立的使用方式服藥。

■ 注意事項

- 若您有以下情形，請告知您的醫(藥)師：
 - 若您為孕婦、哺乳中婦女、肝功能不全者、曾經有過抗精神病藥惡性症候群(Neuroleptic Malignant Syndrom, NMS)、非外傷性橫紋肌溶解症(non-traumatic rhabdomyolysis)者、缺血性心臟病患者。
 - 對entacapone或該藥中任一賦形劑敏感者。
 - 此錠劑含有蔗糖，因此有果糖耐受不良、葡萄糖-半乳糖吸收不良或蔗糖-異麥芽糖酶不足的罕見遺傳疾病患者，建議不宜使用本品。
 - 某些藥物或保健食品，特別是MAOI類藥物(抗憂鬱劑)，可能與此成分產生交互作用。
- 帕金森氏症患者併用entacapone與levodopa可能出現頭暈、姿態性低血壓、嗜睡及發生驟然熟睡的現象，因此在駕駛與操作機械時應特別注意。
- 若服用諾康停錠發生腹瀉者，應追蹤及記錄體重變化，以避免可能產生的體重過度減輕。
- 服用諾康停錠可能會出現衝動控制疾患的行為症狀，包括病態性賭博、性慾增加、性慾亢進、強迫性消費或購物、狂食症以及強迫性進食，若出現這類症狀請立即告知您的醫師。
- 服用諾康停錠會使尿液變成紅棕色，但此現象並無害，請不用害怕。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 諾康停較常見的副作用：失眠、幻覺、困惑、惡夢、運動困難、心絞痛、噁心、腹瀉、腹痛、口乾、便秘、嘔吐、尿液變色、疲倦、出汗增加、跌倒、頭暈、肌肉張力不足、運動機能亢進。
- 其他不常見不良反應包括：肝功能檢查異常、食慾低下、結腸炎、過敏反應(蕁麻疹、紅斑及斑丘疹)、體重減輕。
- 如果開始服用諾康停後出現任何讓您困擾的症狀，請停用諾康停並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0182

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

