

藥品使用指導單

康肯錠、百適歐膜衣錠 (Concor® 1.25 mg、Biso® 5 mg)

■ 藥品成分名

Bisoprolol

■ 藥品外觀

康肯錠：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.5公分

百適歐：黃色，心形，錠劑，中間有刻痕

■ 作用

心臟血管用藥（治療高血壓、狹心症、慢性心衰竭等）

■ 用法

一般建議劑量為每天1.25-10mg。醫生會按照適應症及個別病患的用藥反應進行劑量的調整。

■ 注意事項

- 血糖值變化波動很大的糖尿病患者，須注意血糖明顯下降(低血糖)時，心搏過速、心悸或出汗等症狀可能會被遮蔽。
- 目前尚無有關Bisoprolol分泌於母乳及嬰兒攝取Bisoprolol的安全性資料，因此不建議於授乳期間服用。
- 若您有支氣管氣喘或其他慢性阻塞性肺病，請告知醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
心搏徐緩、無力、頭痛、噁心嘔吐、四肢冰冷或麻木。
- 其他不常見不良反應包括：
過敏反應，包括搔癢、潮紅、皮疹，肌肉痙攣、睡眠障礙。
- 如果開始服用Bisoprolol後，出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 請儲存於室溫(25°C 以下)。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.09, 111.10 修
- PFS-7200-0183

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

