

藥品使用指導單

可迅錠[®]、薩多心[®]持續性藥效錠 (Doxaben[®] 2mg、Xadosin[®] SR 4mg)

■ 藥品成份名

Doxazosin

■ 藥品外觀

可迅：白色長圓柱形錠劑；標記：[CN，2][Pfizer]

薩多心：白色圓凸型錠劑

■ 作用

治療高血壓、良性前列腺肥大症及相關之尿液阻塞。

■ 用法用量

- 一般建議劑量為每天2-4mg。醫生會按照適應症及各別病患的用藥反應，進行劑量的調整，高血壓每日可達16mg，前列腺肥大每日可達8mg。
- 若您是使用薩多心持續性藥效錠，本品外層有不可吸收之特殊設計緩釋膜。因此應整錠吞服，不可以嚼碎、分割或磨碎。同時，若在糞便中發現藥物外殼毋須驚慌。

■ 注意事項

- 肝功能不良之患者，謹慎使用。
- 使用初期可能出現姿勢性低血壓，以眩暈、虛弱症狀表現。服藥後避免快速起立或改變姿勢。
- 服藥期間請小心操作機械或開車。
- 若您有服用其它藥物(例如：ketoconazole、clarithromycin、itraconazole、ritonavir等)或保健食品，請告知醫師。
- 孕婦或授乳婦女應經由醫師評估後，方可使用本藥。
- 進行白內障手術前應告知眼科醫師目前正在使用或曾使用本藥品。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 常見為姿勢性低血壓、眩暈、虛弱、噁心、頭痛、水腫。
- 曾有長時間勃起與異常性陰莖持續勃起的少見案例，如果持續超過四小時，應立即就醫，否則可能導致組織損傷和永久性陽萎。

■ 藥品儲存處置

- 儲存於室溫乾燥處。
- 放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.03

PFS-7200-0184

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮