

# 藥品使用指導單

## 癒利舒盼<sup>®</sup>錠 (Erispan-S<sup>®</sup> 0.25 mg)

### ■ 藥品成分名

Fludiazepam

### ■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；標記：[017]

### ■ 作用

用於改善焦慮、安眠、肌肉痙攣。

### ■ 用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

### ■ 注意事項

- 不得用於下列患者：
  - (1)有急性窄角性青光眼之患者(因抗膽鹼作用可能引發眼壓上升)
  - (2)嚴重重症肌無力之患者(因肌肉鬆弛作用可能引發症狀惡化)
- 請避免與含酒精性的飲料及葡萄柚汁併服。
- 引起嗜睡、注意力、集中力、運動反射能力低下等現象，服用本藥之患者請勿從事駕車或具有危險性機器之操作。
- 本藥品為管制醫藥品，須由醫師處方使用。
- 孕婦或是可能懷孕的婦女，只有經醫師判斷利大於弊時才可給藥。
- 授乳婦女盡可能不要使用本藥，若真的需要使用時，請停止哺乳。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 常見副作用為：嗜睡、頭暈目眩、倦怠感、虛脫感、口渴等。
- 大量使用或突然改變藥品用量可能會引發痙攣、瞻妄、震顫、失眠、不安、幻覺、妄想等症狀發生，請確實遵照醫生指示服用藥物。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.03
- PFS-7200-0186

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

