

藥品使用指導單

憶必佳膜衣錠 (Ebixa® 10 mg)

■ 藥品成分名

Memantine HCl

■ 藥品外觀

黃色，橢圓形錠劑；大小：1.25公分；標記：[1|0][M|M]。

■ 作用

治療阿茲海默症

■ 用法

初始劑量為每日半顆，依個別狀況調整劑量，可逐漸增加劑量至每日二次，每次一錠。

本品可與食物併服或單獨服用。

■ 注意事項

- 對memantine及本品其它成份過敏者禁止使用本品。
- 肝/腎功能不全者，請事先告知醫師。
- 懷孕婦女不建議使用本品；若為哺乳之婦女因病情需要而服用本品，請暫時停止哺乳。
- 若有同時服用 amantadine、ranitidine、抗痙攣藥品或是中樞肌肉鬆弛劑等，請事先告知醫師，需盡量避免與本品併用或進行劑量調整。
- 由於本品可能會改變反應力，故駕車或操作危險機械的患者服用本品須特別小心。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
幻覺、困惑、暈眩、頭痛、疲倦等。
- 較罕見之不良反應包括：
焦慮、肌肉張力異常、嘔吐及膀胱炎等。
- 如果開始服用憶必佳膜衣錠後出現任何讓您困擾的症狀，請暫服藥品並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.03
- PFS-7200-0187

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

