

# 藥品使用指導單

## 優力康錠® (Euricon® 50mg)

### ■ 藥品成分名

Benzbromarone

### ■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.8公分；標記：[SY，50]

### ■ 作用

痛風、高尿酸血症。

### ■ 用法

一天1-3次，一次一錠。優力康沒有抗發炎的效果，故不得使用於急性期治療。且使用本品初期，可能會導致急性發作頻率上升，應接受適當抗發炎治療。

### ■ 注意事項

- 肝功能主要可能會在開始投藥前6個月內發生變化，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。
- 在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。
- 腎結石、腎功能不全、孕婦、可能懷孕之婦女、肝功能不全者不建議使用此藥品。
- 服藥期間建議適當補充水分，能降低腎絞痛症狀發生之機率。
- 本藥品會加強Coumarin類抗凝血劑(如: **Warfarin**)之作用，如有併用請注意是否發生異常出血症狀(如: 血尿、不明瘀青、傷口血流難止...等)。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



## ■ 可能的副作用

- 過敏症: 偶有蕁麻疹、發疹、顏面發紅、紅斑、搔癢感。
- 肝臟: 倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服、茶色尿、黃疸。
- 消化: 偶有胃痛、腹痛、胃不適、胃灼熱、噁心、軟便。
- 其他: 浮腫、心窩不舒服、頭痛。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0188

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮