

# 藥品使用指導單

## 葉酸錠 (Folic acid 5mg)

### ■ 藥品成分名

Folic acid

### ■ 藥品外觀

明黃色，圓扁形，錠劑；大小：0.77公分；標記：[特殊標記][GCPC，0602]

### ■ 作用

預防及治療貧血、補充葉酸、預防胎兒神經管缺損

### ■ 用法

通常成人劑量為每週或每日1~2次，每次1錠(與食物併服)，依個別狀況調整劑量。

### ■ 注意事項

- 若使用葉酸治療後症狀仍無改善請務必盡早回診與醫師討論。
- 使用本藥品治療期間，請勿飲酒。
- 若您有在同時服用抗生素，可能干擾葉酸吸收，請事先告知醫師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：  
噁心、味覺不佳、皮膚潮紅。大劑量時可能造成食慾受影響。
- 其他不常見不良反應包括：  
皮膚過敏、蕁麻疹、癩癧。
- 如果開始服用葉酸錠後出現任何讓您困擾的症狀，請停用藥品並立刻與您的醫療人員聯絡。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0190

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

