

# 藥品使用指導單

## 服樂明膜衣錠 (Foliromin® 50mg)

### ■ 藥品成分名

檸檬酸鈉 亞鐵470.9mg (相當於含鐵量為50mg)

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，雙凸錠劑；大小：1.0公分

### ■ 作用

預防及治療貧血、補充鐵質

### ■ 用法

通常成人劑量為每日2~4錠，可分每日一到二次。飯後服用。又依年齡、症狀適宜增減之

### ■ 注意事項

- 若無缺鐵情況患者，請勿服用。
- 使用本藥品治療期間，排便可能呈現深黑色或干擾糞便檢驗結果。
- 如需併服下列藥物/食物，應於服用鐵劑前或後間隔至少兩小時服用，以避免降低療效
  - 制酸劑、含有鞣酸(如:茶、咖啡、葡萄酒)、含鈣質食物(如:牛奶、鈣片)、抗生素(如:四環黴素、Quinolone)等。
- 若有肝功能不全者，應事先告知醫師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



## ■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：  
噁心、嘔吐、食慾不振，或腹部飽脹感。
- 其他不常見不良反應包括：  
皮膚過敏、皮疹、肝功能指數上升、頭痛、眩暈。
- 如果開始服用服樂明錠後出現任何讓您困擾的症狀，請停用藥品並立刻與您的醫療人員聯絡。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.03
- PFS-7200-0191

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮